

**Annexe 1 Méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose chez les patients co-infectés VIH –VHC**

Auteurs (tests)	Variables utilisés	Critères de fibrose	Indice
Myers et al 2003 Fibrotest	Age, sexe, Bilirubine T, Alpha2 macroglobuline, Haptoglobine, Apolipoprotéine A1, GGT	F ≥ 2 (METAVIR)	AUROC : 0,85 Score < 0,2 F < 2 PD 93 % Score > 0,6 F ≥ 2 PD 86 % PD globale : 89 %
Sterling et al 2005 Fib-4	Age x ASAT (UI/l) / plaquettes (10 <sup>9</sup> /l) x ALAT (UI/l) <sup>½</sup>	Ishak > 4	AUROC : 0,76 Score < 1,45 I < 4 PD 90 % Score > 3,25 I ≥ 4 PD 86 % 38 % non classé
Kelleher et al 2005 SHASTA	-3,84 + 1,7 x (1 si hyaluronate = 41-85 ng/ml ou sinon 0) + 3,28 x (1 si hyaluronate > 85 ng/ml ou sinon 0) + 1,58 x (1 si albumine < 35 g/l ou sinon 0) + 1,78 x (1 si ASAT > 60 UI/l ou sinon 0)	Ishak > 3	AUROC : 0,87 Score < 0,3 I < 3 PD : 94 % Score > 0,8 I ≥ 3 PD: 100 % 58 % non classé

PD : performance diagnostique