

Tableau 3-2 : Survie à 3 ans et risque de décès et selon le diagnostic au moment du Sida (1)

1ere Pathologie classante	SIDA en 1993-1995 (n=7741 patients)		SIDA en 1998-2000 (n=3331 patients)		Risque de décès	
	N	Survie à 3 ans (IC à 95 %)	N	Survie à 3 ans (IC à 95 %)	HR ajusté (IC à 95 %)	p
PJiroveci	1332	50.1 (47.3-52.9)	679	87.4 (84.8-90.0)	0.16 (0.12-0.22)	<0.0001
Tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire	790	66.1 (62.6-69.5)	575	89.7 (87.1-92.3)	0.37 (0.26-0.54)	<0.0001
Candidose oesophagienne	1199	44.3 (41.4-47.2)	489	81.3 (77.6-84.9)	0.41 (0.30-0.55)	<0.0001
Toxoplasmose cérébrale	751	36.7 (33.1-40.3)	365	82.9 (78.8-86.9)	0.21 (0.15-0.30)	<0.0001
Sarcome de Kaposi	1149	41.9 (39.0-44.9)	353	89.0 (85.6-92.3)	0.15 (0.10-0.22)	<0.0001
Lymphome non hodgkinien	327	33.9 (28.6-39.2)	232	63.2 (56.8-69.6)	0.46 (0.33-0.63)	<0.0001
Infection à CMV	778	29.5 (26.1-32.9)	164	77.3 (70.6-83.9)	0.24 (0.16-0.35)	<0.0001
Infection à virus Herpes Simplex	184	61.9 (54.7-69.2)	168	88.8 (83.7-93.8)	0.22 (0.10-0.48)	0.0002
Encéphalopathie liée au VIH	295	42.1 (36.3-48.0)	136	73.4 (65.6-81.1)	0.30 (0.18-0.48)	<0.0001
Mycobactérie atypique	465	30.4 (26.0-34.8)	103	72.1 (62.8-81.3)	0.22 (0.13-0.37)	<0.0001
Cryptococcose	185	42.5 (35.1-49.9)	92	78.4 (69.8-87.1)	0.35 (0.18-0.67)	0.0018
Cryptosporidiose	347	38.1 (32.8-43.4)	88	83.0 (74.8-91.2)	0.13 (0.07-0.26)	<0.0001
Pneumonie bactérienne récurrente	257	70.1 (64.6-75.6)	73	90.9 (84.8-96.9)	0.40 (0.19-0.84)	<0.0001
LEMP	133	26.2 (18.3-34.0)	66	63.4 (51.3-75.5)	0.39 (0.21-0.73)	0.003
Syndrome cachectique	381	41.8 (36.6-47.0)	65	73.0 (61.9-84.0)	0.30 (0.17-0.53)	<0.0001
Total	4619	45.4 (44.2-46.5)	629	82.8 (81.4-84.1)	0.28 (0.25-0.31)	<0.0001

(1) Ajustement sur le sexe, l'âge au SIDA, le taux de CD4 au SIDA, la région de suivi, le groupe de transmission, et l'initiation d'un traitement antirétroviral (monothérapie, bithérapie ou HAART) et la prophylaxie.