

**Tableau 3-I - Proportion d'infections récentes (datant de moins de 6 mois) parmi les découvertes de séropositivité VIH.**

*Cas adultes diagnostiqués en 2004. (Source InVS, France, données au 30 juin 2005)*

	Infections récentes			P (1)
	N	%	[IC 95%]	
<b>Sexe</b>				
Hommes	498	26,1	[24,2 - 28,1]	$p < 10^{-4}$
Femmes	187	15,5	[13,4 - 17,5]	
<b>Groupe d'âge</b>				
< 30 ans	185	23,3	[20,3 - 26,2]	NS
30-39 ans	274	24,5	[21,9 - 27,0]	
40-49 ans	147	21,8	[18,7 - 24,9]	
> = 50 ans	79	18,6	[14,9 - 22,3]	
<b>Mode de contamination</b>				
Rapports homosexuels	332	42,7	[39,2 - 46,1]	$p < 10^{-4}$
Rapports hétérosexuels	262	15,9	[14,2 - 17,7]	
Injections de drogues	12	18,8	[ 9,2 - 28,3]	
Autres/Inconnu	79	15,0	[11,9 - 18,0]	
<b>Nationalité</b>				
France	482	34,6	[32,1 - 37,1]	$p < 10^{-4}$
Europe (hors France)	18	26,1	[15,7 - 36,4]	
Afrique subsaharienne	75	7,8	[ 6,1 - 9,5]	
Afrique du Nord	14	23,0	[12,4 - 33,5]	
Autres/Inconnu	96	18,3	[14,9 - 21,6]	

(1) Test du Chi-2. NS = non significatif